

E-CAP

Vitamin-E USP

Composition : E-Cap 200 : Each E-Cap soft gelatin capsule contains Vitamin-E USP 200 I.U.

E-Cap 400 : Each E-Cap soft gelatin capsule contains Vitamin-E USP 400 I.U.

E-Cap 600 : Each E-Cap soft gelatin capsule contains Vitamin-E USP 600 I.U.

Indications : Vitamin-E is used for the treatment & prevention of Vitamin E deficiency. There is a possible need for supplementation of Vitamin-E in the diet of pregnant & lactating women and for new born infants where anemia can arise as a result of insufficiency of Vitamin-E. Vitamin-E has been tried in the treatment of various disorders including angina pectoris, hypercholesterolaemia, intermittent claudication, fibrocystic breast disease, cancer, nocturnal leg cramps, osteoarthritis etc. Vitamin-E has also been claimed to enhance athletic performance.

Dosage and Administration : 1-2 Capsules daily, or as directed by the registered physician.

Contraindication : Known hypersensitivity to Vitamin-E.

Side Effects : Vitamin-E is usually well tolerated. Large doses may cause diarrhoea, abdominal pain and other gastro-intestinal disturbances.

Storage : Store below 30°C in a dry place.

Packing :

E-Cap 200 : Each box contains 60 capsules in blister pack.

E-Cap 400 : Each box contains 60 capsules in blister pack.

E-Cap 600 : Each box contains 30 capsules in blister pack.

Manufactured by
 **DRUG INTERNATIONAL LTD.**
Tongi, Gazipur, Bangladesh

12/2022/NI

ই-ক্যাপ

ভিটামিন-ই ইউএসপি

গঠন : ই-ক্যাপ ২০০ : প্রতিটি ই-ক্যাপ সফট জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ভিটামিন-ই ইউএসপি ২০০ আই ইউ।

ই-ক্যাপ ৪০০ : প্রতিটি ই-ক্যাপ সফট জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ভিটামিন-ই ইউএসপি ৪০০ আই ইউ।

ই-ক্যাপ ৬০০ : প্রতিটি ই-ক্যাপ সফট জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে ভিটামিন-ই ইউএসপি ৬০০ আই ইউ।

নির্দেশনা : ভিটামিন-ই এর অভাব জনিত রোগের চিকিৎসায় ও প্রতিরোধে। গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মাতা ও নবজাত শিশুদের ভিটামিন-ই এর অভাবে রক্ত স্রাবের চিকিৎসায়। এনজিমা পেকটরিস, কোলেস্টেরল আধিক্য, ক্যান্সার ও শেষ রক্তনিতে পায়ের খিচুনির চিকিৎসায় এবং ইস্টারমিটেন্ট রুডিকেশন, ফাইব্রোসিস্টিক ব্রেস্ট রোগ, ক্যান্সার, অস্ট্রিয় অর্থ্রাইটিসের চিকিৎসায় ভিটামিন-ই এর ব্যবহার দেখা যায়। এছাড়াও ভিটামিন-ই অ্যাথলেটিক পারফরমেন্স বৃদ্ধির সহায়ক।

মাত্রা ও সেবনবিধি : ১-২টি ক্যাপসুল দৈনিক, অথবা রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেব্য।

বিরূপ নির্দেশনা : ভিটামিন-ই এর প্রতি অতি সংবেদনশীলতা।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া : সাধারণতঃ ভিটামিন-ই সুসহনীয়, অতি মাত্রায় সেবনে ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা ও আন্ত্রিক অসুবিধা হতে পারে।

সংরক্ষণ : অনূর্ধ্ব ৩০° সেঃ তাপমাত্রায় শুকনো জায়গায় ঔষধটি সংরক্ষণ করুন।

প্যাকিং :

ই-ক্যাপ ২০০ : প্রতি বাক্সে আছে ৬০ ক্যাপসুলের ব্লিষ্টার প্যাক।

ই-ক্যাপ ৪০০ : প্রতি বাক্সে আছে ৬০ ক্যাপসুলের ব্লিষ্টার প্যাক।

ই-ক্যাপ ৬০০ : প্রতি বাক্সে আছে ৩০ ক্যাপসুলের ব্লিষ্টার প্যাক।

প্রস্তুতকারক
 **ড্রাগ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ**
টংগী, গাজীপুর, বাংলাদেশ